

## Aubergine (*Solanum melongena*)

### Steckbrief

- auch Eierfrucht genannt
- ist im tropischen Ostindien beheimatet
- gehört zur Familie der Nachtschattengewächse, wie Paprika und Tomate
- bis zu 1 m hohe, mehrtriebige Pflanze mit großen Blättern
- attraktive Blüte
- wärmebedürftig, braucht einen tiefgründigen und nährstoffreichen Boden
- außerhalb von Weinbaugegenden im Gewächshaus kultivieren
- violette, glänzende 20 bis 25 cm große, birnenförmige Früchte
- nur **gekocht** verzehren!

### Kultur

#### Vorkultur

Jungpflanzenanzucht ab Mitte März in Saatschalen mit **Aussaaterde** bei 22 °C – 25 °C; im Keimblattstadium in Töpfe pikieren; bei 18 °C weiterkultivieren.

#### Pflanzung

- Mitte Mai, an geschütztem Standort, bei kühlen Temperaturen Vliesabdeckung
- Pflanzabstand: 60 cm x 50 cm im Verband 2 Reihen/Beet, auf Mulchfolie oder Mulchvlies

#### Düngung

Auberginen haben einen **mittleren** Nährstoffbedarf.

#### Düngung bei optimalen Phosphor- und Kaligehalten des Bodens

Klassisch	Biologisch
35 g/m <sup>2</sup> Nitrophoska perfekt oder 35 g/m <sup>2</sup> Entec blau vor der Pflanzung und 25 g/m <sup>2</sup> Kalkammonsalpeter (oder Ammoniumsulfatsalpeter) nach 3 Wochen  <b>oder</b>  3 l/m <sup>2</sup> Kompost und 25 g/m <sup>2</sup> Kalkammonsalpeter (oder Ammoniumsulfatsalpeter) vor der Pflanzung und 25 g/m <sup>2</sup> Kalkammonsalpeter (oder Ammoniumsulfatsalpeter) nach 3 Wochen	3 l/m <sup>2</sup> Kompost und 100 g/m <sup>2</sup> Hornmehl vor der Pflanzung

## Düngung bei hohen Phosphor- und Kaligehalten des Bodens

Klassisch	Biologisch
25 g/m <sup>2</sup> Kalkammonsalpeter (oder Ammoniumsulfatsalpeter) vor der Pflanzung und 25 g/m <sup>2</sup> Kalkammonsalpeter (oder Ammoniumsulfatsalpeter) nach 3 Wochen	100 g/m <sup>2</sup> Hornmehl vor der Pflanzung

### Kulturdauer

- 20 Wochen von der Aussaat bis zur ersten Ernte Mitte August
- 12 Wochen von der Pflanzung bis zur ersten Ernte

### Kulturarbeiten

Wässern, mulchen (schwarze Mulchfolie oder -vlies), ab Fruchtansatz evtl. stäben, um ein Ausbrechen der Triebe zu vermeiden.

### Mögliche Schädlinge

Spinnmilben, Weiße Fliege, Kartoffelkäfer

### Ernte

Fortlaufende Ernte bei sortentypischer Größe und Ausfärbung.

### Sorten

- 'Madonna F1': längliche schwarze Frucht
- 'Mohican': weiße birnenförmige Frucht
- 'Bambino': golfballgroße violette Frucht
- 'Black Beauty': längliche, violettschwarze Frucht

August 2007