

Frühlingszwiebel, Bundzwiebel (*Allium cepa*, *Allium fistulosum*)

Familie: Lauchgewächse (Alliaceae)

Besonderheiten

- Unter die Bezeichnung Frühlings- oder Bundzwiebeln können sowohl früh geerntete.
- Speisewiebeln (*Allium cepa*) als auch Abkömmlinge der Winterheckenzwiebel (*Allium fistulosum*) fallen. Während erstgenannte deutlich verdickte Zwiebelchen ausbilden, weisen Winterhecken-Bundzwiebeln lediglich einen weißen, kaum verdickten Schaft auf.
- Aufgrund der kurzen Kulturdauer und hohen Frosttoleranz eignen sich Frühlingszwiebeln bestens für den Winteranbau. In puncto Winterhärte sind die Winterhecken-Bundzwiebeln den Speisewiebel-Typen überlegen.
- Da zu hohe Feuchtigkeit das Risiko für Pilzinfektionen stark erhöht, sollten die Jungzwiebeln je nach Witterung Ende Oktober bis November mit mobilen Kästen geschützt und im Verlauf des Winters nur sparsam bewässert werden.



Anbau und Ernte

- Empfehlenswerte Sorten (Speisewiebel-Typ): 'Tundra', 'Apache' (rötlich)
- Empfehlenswerte Sorten (Winterheckenzwiebel-Typ): 'Gloria', 'Parade'
- Jungzwiebeln für die Winterernte lassen sich ab Ende Juni entweder direkt ins Beet säen (Reihenabstand 20-25 cm) oder nach der Anzucht von Jungpflanzen auspflanzen. Um Jungpflanzen zu ziehen werden je 3-5 Samen in kleine Töpfchen gesät. Nach 3-4 Wochen können die Setzlinge im Abstand von 30 x 10 cm ausgepflanzt werden.
- Ab November können laufend frische Bundzwiebeln geerntet werden.
- Wer Ende Juli bis Mitte August nachsät, ist auch im Folgejahr ab Anfang März mit Frischgemüse versorgt.



Literatur

COLEMAN, E., 2015: Handbuch Wintergärtnerei. Frisches Biogemüse rund ums Jahr. Löwenzahn Verlag, Innsbruck. 2. Auflage.

PALME, W., 2017: Frisches Gemüse im Winter ernten. Die besten Sorten und einfachsten Methoden für Garten und Balkon. Löwenzahn Verlag, Innsbruck. 2. Auflage.

Bildnachweis

(1) Fröhler, L., 2021

(2) Gemüsebau Deyerling