

Stauden mit hohem Wasserbedarf

– Pracht für ausreichend feuchte Standorte oder gießwillige Gärtner

| | Name | Blütezeit | Licht | Besonderheiten |
|---|---|-----------|-------------|---|
|  | Prachtspiere (<i>Astilbe</i> -Arten und Sorten) | VI-VIII | ☉ ☾ | <ul style="list-style-type: none"> • Einer der wenigen Sommerblüher im lichten Schatten • Zierende Samenstände • Abbildung: <i>Astilbe</i> 'Amethyst' Arendsii-Hybride |
|  | Schlangenkopf (<i>Chelone obliqua</i>) | VII-IX | ☉ ☉ ☾ | <ul style="list-style-type: none"> • Für nährstoffreiche, sonnige bis halbschattige Standorte • Der Name geht auf die auffällige Blütenform zurück |
|  | Silberkerze (<i>Cimicifuga racemosa</i> , <i>C. ramosa</i> , <i>C. simplex</i>) | VII-X | ☉ ☾ | <ul style="list-style-type: none"> • Sehr langlebig • Für nährstoffreiche, absonnige oder lichtsichtige Standorte |
|  | Schildblatt (<i>Darmera peltata</i>) | IV-V | ☉ ☉ ☾ | <ul style="list-style-type: none"> • Imposante Blattschmuckstaude • Blüten erscheinen vor dem Blattaustrieb • Gut am Teichrand einzusetzen, aber auch für halbschattige Standorte geeignet |
|  | Rittersporn (<i>Delphinium Elatum</i> - /Belladonna- Gruppe) | VI + IX | ☉ | <ul style="list-style-type: none"> • Nährstoffbedürftige Prachtstaude, klassisch im Bauerngarten zu finden • Remontierend* |

| | | | | |
|---|--|-----------------|----------------------|--|
|  | <p>Purpurdost (<i>Eupatorium fistulosum</i>, <i>E. maculatum</i>)</p> | <p>VII-X</p> | <p>○ ⊗ ◐</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Großstaude mit später Blüte • Schöner Herbst- und Winteraspekt • Gut für den Teichrand oder sonnige, nährstoffreiche Beete geeignet |
|  | <p>Rosa Mädesüß (<i>Filipendula rubra</i> 'Venusta')</p> | <p>VII-VIII</p> | <p>○ ⊗ ◐</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Duftende Blüten • Gut für den Teichrand, aber auch für sonnige bis halbschattige, nährstoffreiche Beete geeignet |
|  | <p>Kerzen-Greiskraut (<i>Ligularia przewalski</i>)</p> | <p>VII-IX</p> | <p>○ ⊗ ◐</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Bevorzugt halbschattige Standorte • Auffällig eingeschnittenes Laub • Zierende Samenstände |
|  | <p>Blut-Weiderich (<i>Lythrum salicaria</i>)</p> | <p>VII-IX</p> | <p>○</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Gut für den Teichrand oder sonnige, nährstoffreiche Beete geeignet • Heimische Wildstaude, von der zahlreiche Sorten mit hohem Zierwert erhältlich sind • Abbildung: <i>Lythrum salicaria</i> 'Feuerkerze' |
|  | <p>Phlox (<i>Phlox paniculata</i>)</p> | <p>VII-VIII</p> | <p>○</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Klassische Bauerngartenstaude, die sonnige bis halbschattige, nährstoffreiche Standorte schätzt • Duftende Blüten |

| | | | | |
|--|--|----------------|----------------------|---|
| | <p>Jakobsleiter (<i>Polemonium caeruleum</i>)</p> | <p>VI-VII</p> | <p>○ ∅ ◐</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Gut für naturnahe, sonnige Beete oder wiesenartige Pflanzungen geeignet • Remontierend* |
| | <p>Wiesenraute (<i>Thalictrum</i>-Arten)</p> | <p>VI-VIII</p> | <p>○ ∅ ◐</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Abbildung: Prächtige Wiesenraute (<i>Thalictrum rochebruneanum</i>) • Die filigran wirkende Pflanze bringt Leichtigkeit ins Beet • Gut für sonnige bis halbschattige Beete und naturnahe Pflanzungen geeignet |

* Beizeitigem Rückschnitt nach der ersten Blüte treibt die Staude erneut aus und kommt bei ausreichender Wasser- und Nährstoffversorgung ein zweites Mal zur Blüte.

Legende Lichtverhältnisse

| | | |
|----------|------------|----------------|
| ○ Sonnig | ∅ Absonnig | ◐ Halbschattig |
|----------|------------|----------------|

Neben dem eigenen Wissen wurden zur Ausarbeitung dieser Zusammenstellung Informationen der STAUDENGÄRTNEREI GAIßMAYER genutzt. Es handelt sich um eine Auswahl, die keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

Bildnachweis: Lena Fröhler