










Trockenheitsverträgliche Stauden für vollsonnige, gut durchlässige Standorte

Botanischer Name	Deutscher Name	Blütezeit	Besonderheiten
	Perlkörbchen (<i>Anaphalis triplinervis</i> , <i>A. margaritacea</i>)	VIII-X	<ul style="list-style-type: none"> • Gut zum Schnitt und für Trockensträuße geeignet • Graulaubig
	Färberkamille (<i>Anthemis tinctoria</i>)	VI-IX	<ul style="list-style-type: none"> • Graulaubig • Eher kurzlebig, erhält sich aber an passenden Standorten durch reiche Selbstsaat
	Ästige Graslilie (<i>Anthericum ramosum</i>)	V-VI	<ul style="list-style-type: none"> • Heimische, sehr gut trockenheitsverträgliche Art
	Knollige Seidenpflanze (<i>Asclepias tuberosa</i>)	VI-VIII	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr attraktive Samenstände
	Junkerlilie (<i>Asphodeline lutea</i>)	V-VI	<ul style="list-style-type: none"> • Graulaubig • Fruchtschmuck • Wintergrün*¹

	<p>Berg-Aster (<i>Aster amellus</i> 'Veilchenkönigin')</p>	<p>VIII-X</p>	<ul style="list-style-type: none"> • In der Staudensichtung mit *** ausgezeichnet
	<p>Indigolupine (<i>Baptisia australis</i>)</p>	<p>VI-VII</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Laub bleibt bis in den Herbst attraktiv • Benötigt einige Jahre bis zur vollen Entwicklung, dann aber sehr langlebig • Zierende Samenkapseln
	<p>Steinquendel (<i>Calamintha nepeta</i> 'Triumphator')</p>	<p>VII-X</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sterile Sorte, sät sich nicht aus
	<p>Silberdistel (<i>Carlina acaulis</i>)</p>	<p>VI-IX</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr lange Blütezeit • Gut zur Trockenbinderei geeignet
	<p>Kugeldistel (<i>Echinops bannaticus</i> 'Taplow Blue')</p>	<p>VII-IX</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sorte besitzt keine Stacheln • Attraktive Samenstände • Sehr beliebt bei Bienen und Schmetterlingen • Graulaubig

	<p>Spanische Edeldistel (<i>Eryngium bourgatii</i>)</p>	<p>VII-VIII</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Attraktive Samenstände • Blattschmuck • Graulaubig • Gut zum Schnitt und für Trockensträuße geeignet
	<p>Elfenbein-Distel (<i>Eryngium giganteum</i>)</p>	<p>VII-VIII</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Attraktive Samenstände • Blattschmuck • Graulaubig • Gut zum Schnitt und für Trockensträuße geeignet • Kurzlebig, erhält sich jedoch an passenden Standorten durch Selbstausaat
	<p>Walzen-Wolfsmilch (<i>Euphorbia myrsinites</i>)</p>	<p>V-VI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wintergrüne*¹, walzenförmige Triebe • Verbreitet sich an passenden Standorten durch Selbstausaat
	<p>Steppen-Wolfsmilch (<i>Euphorbia seguieriana</i> subsp. <i>niciciana</i>)</p>	<p>VI-X</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Benötigt einige Zeit zum Einwachsen, ist dann aber sehr robust und dauerhaft • Sehr lange Blütezeit • Bläulich-graue Belaubung
	<p>Kleines Mädesüß (<i>Filipendula vulgaris</i>)</p>	<p>VI-VII</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Attraktive, heimische Wildstaude

	<p>Schwertlilie, Bart-Iris (<i>Iris barbata</i>)</p>	<p>V-VI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sortiment bietet prächtige Blüten in nahezu allen Farben des Regenbogens
	<p>Purpur-Witwenblume (<i>Knautia macedonica</i>)</p>	<p>VII-IX</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Eher kurzlebig, erhält sich aber an passenden Standorten durch Selbstausaat
	<p>Echter Lavendel (<i>Lavandula angustifolia</i>)</p>	<p>VI-VII</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fachgerechter Schnitt erhält die Vitalität des Halbstrauchs • Enthält wohlriechende ätherische Öle • Graulaubig
	<p>Katzenminze (<i>Nepeta racemosa</i> 'Superba')</p>	<p>V-VII, IX</p>	<ul style="list-style-type: none"> • In der Staudensichtung mit *** bewertet • Remontiert*²zuverlässig bei zügigem Rückschnitt nach der Blüte • Neigt zur Selbstausaat • Graulaubig
	<p>Blauraute (<i>Perovskia atriplicifolia</i> 'Blue Spire')</p>	<p>VIII-IX</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Der Halbstrauch sollte im Frühjahr komplett zurückgeschnitten werden • Insektenmagnet • Graulaubig

	<p>Steppen-Salbei (<i>Salvia nemorosa</i> in Sorten)</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Remontiert*² bei zügigem Rückschnitt zuverlässig • Boden sollte gut durchlässig sein • Bienenweide
	<p>Fettblatt (<i>Sedum</i>-Arten und Sorten)</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Sowohl hohe, als auch niedrige Vertreter, die allesamt äußerst trockenheitsverträglich sind • Winterschmuckwirkung
	<p>Königskerze (<i>Verbascum</i>-Arten und Sorten)</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Meist zweijährig oder kurzlebig • Erhalten sich an passenden Standorten durch reichliche Selbstaussaat
	<p>Palmlilie (<i>Yucca filamentosa</i>)</p>	<p>VII-VIII</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Immergrüne Belaubung • Die prächtigen Blüten werden erst einige Jahre nach der Pflanzung gebildet

*¹ Das Laub bleibt über den Winter grün und intakt und stirbt erst im Frühjahr zu Beginn der neuen Vegetationsperiode ab

*² Beizeitigem Rückschnitt nach der ersten Blüte treibt die Staude erneut aus und kommt bei ausreichender Wasser- und Nährstoffversorgung ein zweites Mal zur Blüte

Achtung: Kurz nach der Pflanzung sind auch diese trockenheitsverträglichen Kandidaten auf regelmäßige Wasserversorgung angewiesen! Erst wenn die Stauden fest im Boden verwurzelt sind, können sie guten Gewissens sich selbst überlassen werden.

Neben dem eigenen Wissen wurden zur Ausarbeitung dieser Zusammenstellung Informationen der STAUDENGÄRTNEREI GAIßMAYER und der Staudengärtnerei von TILL HOFMANN und FINE MOLZ, sowie des ARBEITSKREISES STAUDENSICHTUNG genutzt. Es handelt sich um eine Auswahl, die keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

Bildnachweis: Lena Fröhler